

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 柴胡清肝湯 エキス散

サイコセイカントウ

ウチダの柴胡清肝湯エキス散は、漢方処方にしたい生薬を配合し抽出して得水製エキスを服用しやすく細粒としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(3) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
**腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- **長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かんの強い傾向のある小児の次の諸症：神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
15歳未満 7歳以上	2.0g
7歳未満 4歳以上	1.5g
4歳未満 2歳以上	1.0g
2歳未満	0.75g以下

〈用法・用量に関連する注意〉

- 添付のサジ1ばいが約1gです。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 服用は15歳未満のものに限ること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1日量(6g)中

柴胡清肝湯エキス……………2.60g

サイコ……………	1.0g
トウキ……………	0.75g
シャクヤク……………	0.75g
センキュウ……………	0.75g
ジオウ……………	0.75g
レンギョウ……………	0.75g
キキョウ……………	0.75g
カロコン……………	0.75g
ハッカ……………	0.75g
カンゾウ……………	0.75g
オウレン……………	0.75g
オウバク……………	0.75g
オウゴン……………	0.75g
サンシシ……………	0.75g
ゴボウシ……………	0.75g

賦形剤として乳糖水和物・パレイシヨデンプン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3