

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

生薬製剤

第2類医薬品

ぎんぎょうげどくさん

銀翹解毒散エキス細粒

本品は、中国の清の時代の呉鞠通による「温病条弁」に記載されています。「銀翹散」を基本にしてつくられた薬です。特に、季節の変わり目や暖冬等で皮膚や気管支等の抵抗力が弱ったときにひき易いかぜに効くのが特長です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
短期間の服用にとどめ、連用しないこと。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - 胃腸の弱い人
 - 高齢者
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 **むくみ**
 - 次の診断を受けた人 **高血圧、心臓病、腎臓病**
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

かぜによるのどの痛み・せき・口（のど）の渴き・頭痛

用法・用量

次の量を食間に水又は白湯で服用してください。
（食間とは食後2～3時間を指します。）

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	1/2包	
7才未満5才以上	1/4包	
5才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 本品3包(7.5g)は

キンギンカ	4.260g	タンズシ	2.136g
レンギョウ	4.260g	ゴボウシ	2.136g
キキョウ	2.556g	タンチクヨウ	1.704g
カンゾウ	2.556g	ケイガイ	1.704g
ハッカ	2.556g	レイヨウカク	0.132g

銀翹解毒散乾燥エキス4.3gを含有する細粒剤です。
添加物として、トレハロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、軽質無水ケイ酸、トウモロコシデンプンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるため。）
- 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。


お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

発売元 株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

発売元
 株式会社ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里4-3-4

製造販売元

松浦薬業株式会社

名古屋市緑区大高町寅新田36