

ラフローラ[®]

第2類医薬品



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛
 - しばらく服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

1日量 12錠(3.6g)中
コウブシ 0.40g
ジオウ 0.40g
センキュウ 0.75g
トウキ 1.5g

エキス…0.61g
カンゾウ末 …0.50g
シャクヤク末 …0.80g
ニンジン末 …0.20g
ビャクジュツ末 …0.10g
ブクリョウ末 …0.25g

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- 本剤は灰褐色で、特異なにおいを有し、味は初めわずかに甘く後わずかに苦い素錠です。
- 本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

効能・効果

更年期障害、血の道症^{a)}、月経不順、冷え症及びそれらに伴う^{b)}次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ^{c)}、血色不良、便秘、むくみ

^{a)}血の道症：婦人病や女性病のことを示します。

^{b)}随伴する：伴って起こることを示します。

^{c)}こしけ：おりもののことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守すること。

ラフローラは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

株式会社 ウチダ和漢薬
電話 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

発売元

株式会社 ウチダ和漢薬

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-2-8
製造販売元

劑盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1