

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの 生薬製剤二号方

ウチダの生薬製剤二号方は、漢方でいわれる「瘀血・血滞」を改善するものです。中年以降または血圧が高く、頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸などの症状のある方の血行を改善し、効果をもたらします。

- お問い合わせ先
 本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。
 株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター
 TEL 03-3806-4141
 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬等によるアレルギー症状(たとえば発熱、発疹、ぜんそく、かゆみ等)を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、吐き気・嘔吐、胃痛
その他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸。

用法・用量

次の1回量を1日3回、食間または空腹時に服用する。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	1包
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

1日量3包(1包2g)中

二号方エキス	4.5g
センキュウ	2.250g
シャクヤク	2.250g
コウカ	2.250g
モッコウ	1.125g
コウブシ	1.125g
丹参	4.500g

賦形剤として乳糖水和物・バレイシヨデンブ、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3