

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

### ◆ウチダの漢方製剤◆

# ウチダの 十味敗毒湯

ジュウミハイドクトウ

ウチダの十味敗毒湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。

#### 成分・分量

本品1袋中		
サイコ	2.5g	ブクリヨウ 2.5g
キキョウ	2.5g	トウドクカツ 1.5g
ハマボウフウ	2.5g	ケイガイ 1.5g
センキュウ	2.5g	カンゾウ 1.5g
オウヒ	2.5g	ショウキョウ 1.0g

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

#### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



#### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 高齢者。
  - (6) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 効能・効果

神経質で胸や脇腹が重苦しいもので化膿症をくり返すフランクロージス、アレルギー性の湿疹、蕁麻疹を起こしやすいもの。癬<sup>注1)</sup>、癬<sup>注2)</sup>、湿疹、蕁麻疹、フランクロージス、アレルギー体質改善

注1) 「癬<sup>よう</sup>」とは赤色を呈した痛みの強いはれものを指します。

注2) 「癬<sup>せつ</sup>」とは毛根を包んでいる部分と皮脂腺の急性炎症を指します。

#### 用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3