

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 桂枝加竜骨牡蛎湯

ケイシカリユウコツボレイトウ

ウチダの桂枝加竜骨牡蛎湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。

成分・分量

本品1袋中

ケイ	ヒ	4.0g	カン	ゾウ	2.0g
シャク	ヤク	4.0g	リュウ	コツ	3.0g
タイ	ソウ	4.0g	ボ	レイ	3.0g
シヨウ	キョウ	1.0g			

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。
むくみ
 - (6)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

直腹筋が拘攣^{注1)}し、腹部の動悸が亢進し、神経過敏で疲労しやすいもので微熱、のぼせ、不眠、めまいなどを伴うもの。神経衰弱、不眠症、夜尿症、陰萎^{注2)}

注1)「拘攣」とは筋肉がひきつり痙攣することを指します。

注2)「陰萎」とは陰茎が勃起しないか、勃起しても硬くならずにじきにたおれてしまうことを指します。

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 東京都荒川区東日暮里 4-3-3