

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 黄芩湯

オウゴントウ

ウチダの黄芩湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎劑で、特異なおいがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

**使用上の注意****相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 次の症状のある人。
むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称 | 症 状 |
|-----------|---|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

* (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

下痢してみぞおちがつかえ腹痛し、直腹筋の攣急^{注1)}があるので、発熱、頭痛、嘔吐、乾嘔^{注2)}、渴などを伴うもの急性腸炎、大腸炎、消化不良症、感冒

注1) 「攣急」とは筋肉がひきつり痙攣して屈伸が困難な症状を指します。

注2) 「乾嘔」とは物のでない嘔吐を指します。

用法・用量

| 年 齢 | 1 日 量 |
|-----------|---|
| 大人(15歳以上) | 1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。 |
| 15歳未満 | 服用しないこと |

成分・分量

本品1袋中

| | |
|-------|------|
| オウゴン | 4.0g |
| タイソウ | 4.0g |
| カンゾウ | 3.0g |
| シャクヤク | 3.0g |

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8