

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 小柴胡合半夏厚朴湯

ショウサイコゴウハンゲコウボクトウ

ウチダの小柴胡合半夏厚朴湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品1袋(1日分)中			
サ イ コ	7g	ニ ン ジ ン	3g
ハ ン ゲ	5g	カ ン ソ ウ	2g
シ ョ ウ キ ョ ウ	1g	ブ ク リ ョ ウ	5g
オ ウ ゴ ン	3g	コ ウ ボ ク	3g
タ イ ソ ウ	3g	ソ ヨ ウ	2g
		全 量	34g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき、水800mLを加え、あまり強くない火にかけ、400mLに煮つめ、袋をとり出し更に200mLに煮つめ、3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8