

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 三黄瀉心湯

サンオウシャシントウ

ウチダの三黄瀉心湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）

- * 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

- * (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- (5) だらだら出血が長びいている人。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- * (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- * (2) 1ヵ月位（鼻血に服用する場合には5～6回、痔出血、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

成分・分量

本品1袋中
 ダイオウ 3.0g
 オウゴン 3.0g
 オウレン 3.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

のぼせ症で精神不安があり胃部がつかえ、便秘がひどいもので不眠、心悸亢進、充血、顔面の紅潮、耳鳴などを伴うもの
 高血圧症、動脈硬化症、鼻血、痔出血、常習便秘

用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水300mL（約1合7勺）を加え、あまり強くない火にかけ150mL（約8勺）に煮詰め袋をとり出し、2～3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服あるいは冷服（出血のあるとき）する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8