

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 酸棗仁湯

サンソウニントウ

ウチダの酸棗仁湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

* (3) 胃腸の弱い人。

- (4) 下痢又は下痢傾向のある人。
- (5) 高齢者。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

* 4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

効能・効果

心身がつかれ、弱って眠れないもの

用法・用量

年齢	1日量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき水約600mLを加え、あまり強くない火にかけ約300mLに煮つめ、袋をとり出し3回に分けて食前1時間又は食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

本品1袋（1日分）中

チ	モ	3.0g
セン	キュウ	3.0g
ブ	クリョウ	5.0g
カン	ゾウ	1.0g
サン	ソウニン	10.0g
全	量	22.0g

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8