

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 小柴胡湯加桔梗石膏

ショウサイコトウカキキョウセッコウ

ウチダの小柴胡湯加桔梗石膏は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

* (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

* (4) 胃腸の弱い人。

- (5) 高齢者。
(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
むくみ
(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

* (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
* 肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品1袋（1日分）中

サ イ コ	7g	ニ ン ジ ン	3g
ハ ン ゲ	5g	カ ン ソ ウ	2g
シ ョ ウ キ ョ ウ	1g	キ キ ョ ウ	3g
オ ウ ゴ ン	3g	セ ッ コ ウ	10g
タ イ ソ ウ	3g		

全 量 37g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎。

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15歳以上）	1袋（1日分）につき、水800mLを加え、あまり強くない火にかけ、400mLに煮つめ、袋をとり出し、更に200mLに煮つめ、3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8