

第3類医薬品

◆ウチダの和漢生薬◆

ウチダの せんぶり

日本薬局方 センブリ



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法・用量

年 齢	1 日 量
大人（15歳以上）	1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。
15歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量（1.5g）中
日本薬局方センブリ 1.5g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

※本品には、品質保持（カビ・虫害等防止）のために脱酸素剤が入っております。

NMK



株式会社 ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区蚬ヶ池 1755-3