

第3類医薬品

## ◆ウチダの和漢生薬◆

## ウチダの 黄柏末

日本薬局方 オウバク末



## 使用上の注意



## 相談すること

## 内用

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 発熱を伴う下痢のある人、高齢者。
  - 血便のある人、粘液便の続く人。
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 外用

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
  - 切傷等の外傷のある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

## 副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

## 効能・効果

（内用）胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

（外用）うちみ、ねんざ

## 用法・用量

（内用）

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人（15歳以上）	1g
15歳未満	服用しないこと

（外用）

外用は水で練って貼る。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

1回量は添付のサジ約3杯です。

内用：定められた用法・用量を厳守すること。

外用：（1）定められた用法・用量を厳守すること。

（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

（3）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

## 成分・分量

1日量（3g）中

日本薬局方オウバク末 3g

NMK



株式会社 ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3